



# TEST.RIZIKA.OD.OSTEOPOROZE

**JESTE LI IZLOŽENI RIZIKU OD  
OSTEOPOROZE I PRIJELOMA?**

Otkrijte tako što ćete riješiti ovaj brz i jednostavan test rizika

---

Neka osteoporoza ne utječe na vaš život!  
Ako ste izloženi riziku, обратите se svom liječniku

↗ [www.osteoporosis.foundation](http://www.osteoporosis.foundation)

## 1. Imate 60 godina i više?

- Da
- Ne



Rizik od osteoporoze povisuje se s godinama. Čak i ako nemate ostalih kliničkih faktora, ako ste žena od 60 godina i starija ili muškarac od 70 godina i stariji, trebali biste razgovarati sa svojim liječnikom o zdravlju svojih kostiju.

## 2. Jeste li imali prijelom neke kosti nakon pedesete godine?

- Da
- Ne



Ako ste imali prijelom kosti nakon blažeg pada (pad s vaše visine) uzrok može biti osteoporoza. Jedan prijelom kosti velik je faktor rizika za nove prijelome, a najviši je rizik unutar sljedeće dvije godine.

## 3. Jeste li vrlo mršavi (Indeks tjelesne mase niži od 19)?

- Da
- Ne

Kako izračunati Indeks tjelesne mase (BMI):	Vrijednosti BMI-a	Značenje
Metričke jedinice	Niži od 19,0	Pothranjenost
$BMI = \frac{\text{težina u kilogramima}}{\text{visina u metrima}^2}$	19,1 do 24,9	Normalno/Zdravo
	25,0 do 29,9	Prekomerna težina
	Iznad 30,0	Pretilost



Ako je Indeks tjelesne mase (BMI) niži od  $19 \text{ kg/m}^2$  viši je rizik od osteoporoze. Pothranjenost može dovesti do niže razine estrogena kod djevojaka i žena, sličnom onom nakon menopauze, što može pridonijeti razvoju osteoporoze. Istovremeno, osobe nježnije građe imaju viši rizik od prijeloma kostiju.



**Ako ste odgovorili „da“ na 2 ili više od navedenih pitanja, vaši odgovori sugeriraju da možda imate visok rizik za razvoj osteoporoze i prijelome kostiju. Preporučili bismo vam da zatražite pregled i sa svojim liječnikom razgovarate o načinima na koji možete smanjiti rizik od prijeloma vezanih uz osteoporozu.**

#### **4. Nakon četrdesete godine izgubili ste više od 4 cm visine?**

- Da
- Ne
- Ne znam



Gubitak više od 4 cm kod odrasle osobe često je uzrokovani prijelomima kralježnjaka zbog osteoporoze. Nisu svi prijelomi kralježaka bolni što znači da neki ljudi ni ne znaju da ih imaju.

#### **5. Jeste li vi ili vaši roditelji imali prijelom kuka?**

- Da
- Ne



Ako su vaši roditelji imali prijelom kuka možete imati viši rizik od razvoja osteoporoze i samog prijeloma. Ako se samo jedan od vaših roditelja pogrbo ili imate osteoporozu u obitelji, i to može biti znak da imate veći rizik od razvoja osteoporoze.

#### **6. Imate li bilo koji od sljedećih poremećaja?**

- Reumatoidni arthritis
- Bolesti probavnog trakta (upalna bolest crijeva, celijakija)
- Rak prostate ili rak dojke
- Dijabetes
- Kroničnu bolest bubrega
- Poremećaji štitnjače ili paratireoide (hipertireoza, hiperparatiroidizam)
- Plućni poremećaj (kronična opstruktivna bolest pluća (KOPD))
- Niska razina testosterona (hipogonadizam)
- Rana menopauza, gubitak mjesecnice, uklonjeni jajnici (niska razina estrogena zbog hipogonadizma)
- Producen Nepokretnost (npr. nesposoban hodati bez pomoći)
- HIV
- Ne znam, ali pitat ću svog liječnika
- Ništa od navedenog



Neki medicinski poremećaji povezani su s povišenim rizikom od osteoporoze i prijeloma. To se zove i sekundarna osteoporoza. Neka stanja također mogu povisiti rizik od pada koji može dovesti do prijeloma.

## 7. Jeste li se liječili bilo kojim od sljedećih lijekova?

- Glukokortikosteroidi ili „kortikosteroidi”, koji se koriste za liječenje upale (npr. tablete predninozon 3 mjeseca ili duže)
- Inhibitori aromataze koji se koriste u liječenju raka dojke
- Terapija deprivacije androgena koja se koristi u liječenju raka prostate
- Tiazolidindioni koji se koriste u liječenju dijabetesa (npr. pioglitazon)
- Imunosupresivi koji se koriste nakon transplantacija (npr. inhibitor fosfataze kalmodulina/kalcineurina)
- Antidepresivi koji se koriste u liječenju depresije, oopsativno-kompulzivnog poremećaja itd. (npr. selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI))
- Antikonvulzivi ili antiepileptični lijekovi koji se koriste u liječenju napada (npr. fenobarbital, karbamazepin i fenitoin)
- Ne znam, ali pitat će svog liječnika
- Ništa od navedenog



Dugotrajno uzimanje određenih lijekova može povećati gubitak koštane mase što može dovesti do povišenog rizika od prijeloma. Neki lijekovi povisuju i rizik od pada koji može dovesti do prijeloma kostiju.

## 8. Pijete li veće količine alkohola (više od 3 jedinice dnevno) i/ili pušite?

- Da
- Ne



Previše alkohola negativno utječe na zdravlje kostiju, a može dovesti i do češćih padova, što povisuje rizik od frakturna.



Bilo da ste pušač ili ste bili pušač morate biti svjesni da pušenje negativno utječe na zdravlje kostiju.

## HVALA ŠTO STE ISPUNILI IOF-OV TEST RIZIKA OD OSTEOPOROZE

### AKO STE ODGOVORILI „DA“ NA BILO KOJE PITANJE U OVOM TESTU



**VAŠI ODGOVORI SUGERIRAJU DA MOŽDA IMATE  
FAKTORE RIZIKA OD OSTEOPOROZE I PRIJELOMA.**

Preporučujemo vam da o zdravlju svojih kostiju i načinima na koje možete sprječiti prijelome vezane uz osteoporozu razgovarate sa svojim liječnikom. On vam može savjetovati i da napravite procjenu rizika i/ili denzitometriju (pretragu gustoće kostiju).

Preporučujemo vam i da pogledate i sljedeće stranice s ostalim čimbenicima rizika od osteoporoze koji se mogu primjenjivati na vas i da redovno provjeravate rizik od osteoporoze i prijeloma.

### AKO NISTE ODGOVORILI „DA“ NA BILO KOJE OD OSAM PITANJA U OVOM TESTU RIZIKA

Provjerite mogu li se na vas primijeniti ostali faktori rizika od osteoporoze, prikazani na sljedećim stranicama.

Kako biste na internetu ponovili test, posjetite  
<http://riskcheck.iofbonehealth.org>

# ODNOSE LI SE NA VAS BILO KOJI DODATNI ČIMBENICI RIZIKA OD OSTEOFOROZE?

## ČIMBENICI RIZIKA KOJE MOŽETE PROMIJENITI

### IZBJEGAVATE MLIJEČNE PROIZVODE?



Kalcij, najvažniji mineral za vaše kosti, većinom se nalazi u mliječnim proizvodima. Izbjegavate ih ili ste alergični ili imate intoleranciju na mlijeko/mliječne proizvode, a ne uzimate kalcij kao dodatak prehrani, vjerojatno vam nedostaje kalcija i imate viši rizik za osteoporozu.

### NISTE DOVOLJNO NA SUNCU?



Provodite li manje od 10 minuta dnevno vani (tako da su djelovi vašeg tijela izloženi sunčevoj svjetlosti), a ne uzimate vitamin D kao dodatak prehrani? Vitamin D stvara se u koži nakon izlaganja sunčevim UVB zrakama. Vitamin D pomaže zdravlju kostiju jer je nužan za apsorpciju kalcija.

### MALA FIZIČKA AKTIVNOST?



Jeste li fizički aktivni manje od 30 minuta dnevno (kućanski poslovi, hodanje, trčanje itd.)? Nedostatak fizičke aktivnosti rezultira gubitkom koštane i mišićne mase. Redovita lagana aktivnost (lagano trčanje ili hodanje) i vježbe za jačanje mišića pomažu osnažiti kosti i mišiće.

### ČESTI PADOVI?



Padovi su glavni uzrok prijeloma i svatko tko često pada (više od jednom godišnje) izložen je višem riziku od prijeloma kosti. Vježbajte kako biste poboljšali snagu mišića i ravnotežu te pogledajte kako možete sprječiti padove u svom domu – to može sniziti rizik od padova.

## FAKTORI RIZIKA KOJI SE NE MOGU PROMIJENITI

### REUMATOIDNI ARTRITIS?



Sam reumatoидni artritis i korištenje kortikosteroida u liječenju ove bolesti može dovesti do osteoporoze.

### DIJABETES?



Dijabetes tipa 1 i 2 može biti povezan s povišenim rizikom od prijeloma.

### TERAPIJA ZA RAK PROSTATE ILI RAD DOJKE?



Rak prostate i rak dojke liječe se hormonskom terapijom što dovodi do gubitka koštane mase. Terapije kao što je kemoterapija, zračenje i liječenje kortikosteroidima također negativno utječu na zdravlje kostiju.

## TERAPIJA GLUKOKORTIKOSTEROIDIMA?



Glukokortikosteroidi, često poznati i kao „kortikosteroidi” (npr. prednizon) često se pripisuju za stanja kao što je astma, reumatoidni artritis i neke upalne bolesti. Korištenje kortikosteroida duže od 3 uzastopna mjeseca može dovesti do gubitka koštane mase, a gubitak je brži u prvih 3 – 6 mjeseci terapije.



## HIPERTIREOZA I HIPERPARATIREOIDIZAM?

Hipertireoza i hiperparatiroidizam dovode do gubitka koštane mase i osteoporoze.



## RANA MENOPAUZA?

Jeste li ušli u menopazu prije 45 godine? Estrogen štiti kosti, a jednom kad započne menopauza vaše tijelo proizvodi nižu razinu estrogena i gubitak koštane mase ubrzano raste.



## GUBITAK MJESEČNICE?

Jeste li ikad izgubili mjesečnicu 12 uzastopnih mjeseci ili duže (osim u slučaju menopauze ili histerektomije)? Izostanak mjesečnice tijekom dužeg razdoblja znak je niske razine stvaranja estrogena – čimbenika koji povisuje rizik od osteoporoze.



## UKLONJENI JAJNICI?

Jesu li vam uklonjeni jajnici prije pedesete godine života, a niste uzimali hormonsku nadomjesnu terapiju? Vaši jajnici odgovorni su za proizvodnju estrogena i gubitak jajnika znači manjak estrogena – čimbenik koji povisuje rizik od osteoporoze.



## NISKE RAZINE TESTOSTERONA?

Jeste li ikad patili od impotencije, gubitka seksualne želje ili drugih simptoma vezanih uz niske razine testosterona? Testosteron kod muškaraca igra ulogu sličnu estrogenu kod žena: niske razine ovog hormona negativno utječu na zdravlje kostiju i mogu povisiti rizik od osteoporoze.



## BOLESTI PROBAVNOG TRAKTA?

Stanja poput ulceroznog kolitisa, Crohnove bolesti ili celijakije dovode do loše apsorpcije hranjivih tvari iz hrane. Zbog lošije apsorpcije kalacija i ostalih hranjivih tvari (često i pothranjenosti) rizik od osteoporoze je povišen. Nije vjerojatno da će na dugoročno zdravlje kostiju utjecati bezglutenska dijeta koje se pridržavaju osobe s celijakijom.

Ako se bilo koji čimbenik rizika odnosi i na vas, to ne znači da imate osteoporozu nego znači da imate veću mogućnost da se kod vas razvije ovo stanje. U tom slučaju razgovarajte sa svojim liječnikom o zdravlju kostiju, a on vam može savjetovati i provjeriti zdravlja kostiju. Ako niste prepoznali ni jedan čimbenik rizika, naša je preporuka da vodite život koji je zdrav za kosti i pratite ove rizike u budućnosti.

## SAVJETI ZA ZDRAVIJE KOSTI

- **Povećajte razinu tjelesne aktivnosti:** nastojte vježbati 30 – 40 minuta, tri do četiri puta svakog tjedna. U vježbanje uvrstite i vježbe s utezima i vježbe otpora.
- **Neka vaša prehrana bude hranjiva i uravnotežena, s dovoljno kalcijem -** pogledajte naše preporuke za unos kalcija na internetu
- Intolerancija na laktuzu? Dozajnjte više o drugim **namirnicama bogatim kalcijem** ili dozajnjte koje mlječne proizvode možete umjereno uzimati: kako biste procijenili približan unos kalcija poslužite se Kalkulatorom kalcija IOF-a dostupnim na našoj internetskoj stranici
- Provodite više vremena vani, na zraku, kako biste dobili dovoljno **vitamina D** ili po potrebi uzimajte nadomjestke
- **Izbjegavajte pušenje i samo umjereno uživajte u alkoholu**

## NEKA OSTEOPOROZA NE UTJEČE NA VAS, VAŠU OBITELJ ILI PRIJATELJE!

Više informacija o osteoporozi, osteoporotskim prijelomima i nacionalnom društvu za osteoporozu pronađite na: [www.osteoporosis.foundation](http://www.osteoporosis.foundation)

- [facebook.com/iofbonehealth/](https://facebook.com/iofbonehealth/)
- [twitter.com/iofbonehealth/](https://twitter.com/iofbonehealth/)
- [linkedin.com/company/international-osteoporosis-foundation/](https://linkedin.com/company/international-osteoporosis-foundation/)
- [instagram.com/worldosteoporosisd/](https://instagram.com/worldosteoporosisd/)
- [youtube.com/iofbonehealth/](https://youtube.com/iofbonehealth/)
- [pinterest.com/iofbonehealth/](https://pinterest.com/iofbonehealth/)